



Sempre que tiver dúvidas deve contactar a sua equipa de saúde

É IMPORTANTE ESTAR ATENTO:

A estes sintomas e a outros não mencionados neste folheto;

Os efeitos secundários descritos mais frequentemente são os afrontamentos, náuseas, mal-estar e fadiga, assim como as irritações no local da injeção.

A terapêutica não deve ser interrompida, mesmo que exista melhoria.

MUITO IMPORTANTE

NÃO DEVE INTERROMPER O TRATAMENTO SEM ANTES FALAR COM O SEU MÉDICO!



Equipa de Enfermagem da Consulta Externa e Setor de Técnicas

Diretor: Prof. Dr. Arnaldo Figueiredo
Enfermeiro Chefe: António Janeiro

Dias úteis das 8h às 18h
Tel: 239 400 400 / 239 400 572



Cancro da Próstata TRATAMENTO HORMONAL



Próxima administração
marcada para o dia

___/___/___

TRATAMENTO HORMONAL DO CANCRO DA PRÓSTATA

Estes medicamentos (análogos e antagonistas LH RH) são utilizados para diminuir a produção de testosterona.

Podem ser administrados por via subcutânea (leuporrelina, degarelix) ou por via intramuscular (triptorrelina). A solução injetada forma um depósito a partir do qual ocorre uma libertação contínua da substância ativa.




fig.1-Administração por via subcutânea e intramuscular

Se não for prescrito de outra forma pelo seu Urologista assistente, são administrados uma vez a cada 6 meses no caso da leuporrelina e triptorrelina, e uma vez por mês no caso do degarelix.

CUIDADOS NO LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO

Poderá apresentar no local de administração alguns sinais como:

- > rubor;
- > calor;
- > endurecimento;
- > ardor.

Para aliviar esses sinais, poderá massajar e aplicar gelo.

Nesse local também é possível que apresente um pequeno nódulo (tipo grão de ervilha), que não desaparecerá.

A administração do medicamento será feita em local diferente e alternado (esquerda/direita).

**ESTES MEDICAMENTOS SÓ
PODERÃO SER
ADMINISTRADOS POR UM
ENFERMEIRO**

EFEITOS SECUNDÁRIOS MUITO FREQUENTES

- > Afrontamentos;
- > Diminuição da libido;
- > Fadiga e diminuição da massa muscular;
- > Impotência;
- > Vermelhidão da pele.

EFEITOS SECUNDÁRIOS FREQUENTES

- > Sintomas de uma constipação normal;
- > Náuseas e mal-estar gástrico e intestinal (diarreia);
- > Comichão;
- > Suores noturnos;
- > Dor nas articulações;
- > Sensibilidade mamária e testicular;
- > Alterações hematológicas.